

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Аоктера для улучшения усвояемости кормов и повышения продуктивности сельскохозяйственных птиц и свиней

(организация-производитель: фирма «Shundong Aobo Bio-Tech Co., Ltd» / «Шандонг Аобо Био-Тех Ко., Лтд», Китай)

I. Общие сведения

1. Аоктер (Aocster) - добавка кормовая для улучшения усвояемости кормов и повышения продуктивности сельскохозяйственных птиц и свиней.

2. Добавка кормовая содержит в качестве действующего вещества термостабильную фитазу, продуцируемую *Trichoderma longibrachiatum* – 5%, и наполнитель кукурузный крахмал – до 100%. Ферментативная активность фитазы - не менее 10 000 Ед/г.

Аоктер не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, установленных в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой порошок от белого до коричневого цвета.

4. Кормовую добавку выпускают расфасованной по 25 кг в многослойных мешках, картонных барабанах или коробках, а также по 500-1000 кг в биг-бэги.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-изготовителя, его адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения кормовой добавки, гарантированных показателей, даты изготовления, срока и условий хранения, массы нетто, номера партии, знака соответствия, надписи «Для животных». Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, месте при температуре от минус 10⁰С до 35⁰С.

Срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Не использовать по окончании срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства Аоктера обусловлены высоким содержанием фермента фитазы, который улучшает перевариваемость грубых кормов, усвояемость питательных веществ рациона, включая фосфор, кальций, протеин и аминокислоты, восполняет дефицит энергии в рационе, улучшает вкусовые качества и поедаемость кормов и, как следствие, повышает продуктивность сельскохозяйственных птиц и свиней, экономическую эффективность свиноводства и птицеводства в целом.

Кормовая добавка безвредна для свиней и птиц, не оказывает раздражающего действия на слизистую желудочно-кишечного тракта.

III. Порядок применения

6. Аоктер применяют для улучшения усвояемости кормов и повышения продуктивности сельскохозяйственных птиц и свиней.

7. Аоктер вводят в корма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Норма ввода для бройлеров и свиней всех технологических групп составляет 240-400 г/тонну корма, для несушек – 180-240 г/тонну корма.

Комбикорма и кормосмеси с кормовой добавкой Аоктер не рекомендуется подвергать термической обработке выше 90°C.

8. При применении добавки кормовой в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено.

9. Аоктер совместим с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

10. Противопоказаний не установлено.

11. Продукцию свиноводства и птицеводства после применения добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Аоктером следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. При случайном контакте кормовой добавки с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с Аоктером.

14. Добавку следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «ВитОМЭК» (г.Москва) совместно с организацией-производителем: «Shundong Aobo Bio-Tech Co., Ltd» (Китай).

Адрес производства:

1. North Chaoyue Road, ETDZ, Gaotang, Shandong, China

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-8.17/05053